

ISTRUZIONI PRE-OPERATORIE PER INTERVENTI DI CHIRURGIA ORALE

COPERTURA ANTIBIOTICA

• A meno di diversa prescrizione del chirurgo, si deve iniziare una copertura antibiotica per via orale la sera precedente l'intervento. Proseguire l'assunzione come prescritto anche il giorno dell'intervento ed i successivi. Salvo il caso di allergie o di intolleranze accertate, il farmaco di prima scelta è costituita dall'associazione amoxicillina ed acido clavulanico.

• Non fumare

SANGUINAMENTO

• Sospendere preventivamente tutti i farmaci anticoagulanti (quali: Coumadin, Sintrom ecc.) ed instaurare una terapia sostitutiva, in accordo con lo specialista, con Eparina (tipo Clexane o similare)

• Sospendere i farmaci antiaggreganti (Acido Acetilsalicilico, Aspirina, Aspirinetta, Cardioaspirina, Ticlopidina, Tiklid, Clopidogrel, Plavix) da 7 a 10 giorni prima dell'intervento. Valutare con lo specialista se instaurare una terapia sostitutiva.

SEDAZIONE

• Potrebbe esserle somministrato un farmaco con finalità ansiolitiche e miorilassanti. Tale farmaco potrebbe essere una benzodiazepina (es. Valium, Halcion, ecc.) oppure protossido d'azoto (gas esilarante). Tali farmaci possono indurre una leggera sonnolenza per un paio d'ore e ritardare i riflessi nelle ore successive all'assunzione. Pertanto si sconsiglia l'uso dell'automobile nell'immediato post-operatorio. L'azione delle benzodiazepine potrebbe essere amplificata dalla concomitante assunzione di alcolici o di altri farmaci attivi sul sistema nervoso centrale. I pazienti affetti da insufficienza epatica o problemi respiratori sono invitati a far presente tali patologie al personale di studio per rimettere al Prof. De Leonardis la decisione sull'opportunità o meno della sedazione.

DOLORE

• Un modesto dolore, con andamento intermittente per alcuni giorni, è normale dopo l'intervento. Dotarsi di un analgesico - antiinfiammatorio tipo: ibuprofene, nimesulide, naprossene, ketoprofene ecc.

GONFIORE

• Si aspetti un certo gonfiore di entità variabile, che potrà durare dai 3 agli 8 giorni. Per contrastarlo saranno necessari: ghiaccio, cortisonici (orali o intramuscolo), pomate (Arnica, Reparil).